


BOOM EFEKT

5 l
20 l

COMPOSICIÓN

Glifosato 36% (SAL ISOPROPILAMINA) p/v (360 g/l)
Concentrado soluble [SL]

USOS

Áreas no cultivadas, Cultivos, Plantaciones Agrícolas, Plantaciones Forestales, Praderas, Redes viarias y de servicio agrícolas.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD

CULTIVO	PLAGA/EFECTO	DOSIS (L/HA)	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	PS. (días)
Caminos Linderos Márgenes de acequias Márgenes de cultivos	Malas hierbas	5 – 10%	Observar las precauciones indicadas para los correspondientes cultivos o plantaciones adyacentes	NP
Canales de riego			Sólo en márgenes o, previo corte del agua en el cauce, dejando un plazo de al menos 7 días antes de hacer circular el agua de nuevo	
Praderas			Sólo en aplicaciones puntuales para tratar malezas leñosas o en zonas localizadas para tratar malas hierbas cuando se pretenda la regeneración de praderas o pastizales	
Cortafuegos	Malas hierbas	3 – 10	Quando las infestantes sean gramíneas anuales en estado de crecimiento precoz, puede reducirse las dosis hasta 1,5 l/ha	NP
Recintos industriales Redes de servicios Solares Vías férreas			-	
Herbáceas extensivas, Herbáceas intensivas	Malas hierbas anuales	3-6	Tratar únicamente en presiembra del cultivo. En el caso de que las infestantes sean gramíneas anuales en estado de crecimiento precoz, puede reducirse las dosis hasta 1,5 l/ha	NP
	Malas hierbas vivaces	6-10	Tratar únicamente en presiembra del cultivo	
Terrenos agrícolas	Malas hierbas	3-6	Aplicar antes de la siembra o plantación respetando un plazo de 1 día para efectuar las mismas, o bien después de la recolección	NP
Terrenos forestales			Aplicar antes de la plantación o una vez instalada para la limpieza del monte	
Leñosas	Malas hierbas anuales	3-6	Sólo en cultivos de porte no rastrero, de más de 3-4 años y en aplicación dirigida. Cuando las infestantes sean gramíneas anuales en estado de crecimiento precoz, puede reducirse las dosis hasta 1,5 l/ha	NP
	Malas hierbas vivaces	6-10	Sólo en cultivos de porte no rastrero, de más de 3-4 años, en aplicación dirigida	

P.S.: Plazo de seguridad (días) NP: No procede fijar plazo de seguridad

MODO DE EMPLEO

Controla las malas hierbas en postemergencia.

Pulverizar diluido en agua a baja presión.

Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes de los cultivos.

En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 l/ha realmente tratada y un P.S. de 7 días.

No realizar tratamientos con dosis mayores de 1,8 kg de s.a./ha en terrenos forestales si existen setas silvestres en la zona tratada.

No permitir la entrada de ganado a las parcelas tratadas hasta haber transcurrido 10 días desde la fecha de aplicación.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS



NÚMERO DE REGISTRO

25.401

