



COMPOSICIÓN

Aceite de parafina 79% p/v (790 g/l).
Concentrado emulsionable (EC).

USOS AUTORIZADOS

Aplicar mediante pulverización normal, con tractor o manual.
 Máximo 4 aplicaciones por campaña con un intervalo de 15 días.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (l producto /hl caldo)	VOLUMEN (l caldo/ha)	ETAPA DE APLICACIÓN
Cítricos (1)	Cochinillas	1-2 l/hl	1.000-2.000 l/ha	De fin de floración a maduración avanzada
Cítricos (1)	Cochinillas Ácaros Pulgones	1-1,5 l/hl	1.000-1.500 l/ha	De reposo a fin de floración
Frutales de hueso (2) Frutales de pepita (3)	Ácaros	1 l/hl	1.000-2.000 l/ha	De fin de floración a madurez avanzada
Almendro*, Avellano*, Kumquat*, Nogal*, Pistacho*	Cochinillas	1-2 l/hl	1.000-2.000 l/ha	De fin de floración a madurez avanzada
	Ácaro Pulgones	1-1,5 l/hl	1.000-1.500 l/ha	De reposo a fin de floración
Caqui*, Granado*	Cochinillas	1-2 l/hl	1.000-2.000 l/ha	De fin de floración a madurez avanzada
	Pulgones	1-1,5 l/hl	1.000-1.500 l/ha	De reposo a fin de floración

(1) Cítricos: Naranja, Mandarino, Limonero, Lima y Pomelo.

(2) Frutales de hueso: Melocotonero, Nectarino, Albaricoquero, Ciruelo y Cerezo.

(3) Frutales de pepita: Manzana, Peral, Membrillero, Níspero.

PRECAUCIONES DE USO

Aplicar antes del cambio de color de los frutos.

No aplicar antes de 40 días de haber aplicado azufre.

No aplicar durante la floración.

No aplicar fuera del intervalo 5-35°C.

En condiciones de deficiencia hídrica, regar antes del tratamiento.

No aplicar en días calurosos y secos.

No use LUQSOL PREMIUM en mezcla con los siguientes productos: captan, folpet, ziram y thiram. Respete un período mínimo de 15 días entre una aplicación de LUQSOL PREMIUM y una aplicación con uno de los productos mencionados anteriormente.

PLAZO DE SEGURIDAD

NP: no procede.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS



NÚMERO DE REGISTRO

20.036

Insecticida utilizable en la producción ecológica según el RCE 834/2007.

Autorizado en Jardinería exterior doméstica el envase de 500 ml.

