


TEBULUQ PLUS



COMPOSICIÓN

Tebuconazol 25% p/v (250 g/L) (24,2% p/p).
 Contiene dodecibenceno sulfonato cálcico (N° CAS 26264-06-2).

USOS

TEBULUQ PLUS es un fungicida sistémico del grupo de los DMI (subgrupo triazoles), con acción preventiva, curativa y erradicante frente a un amplio espectro de hongos (Basidiomicetos, Ascomicetos y Deuteromicetos). A nivel bioquímico actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol mediante inhibición de la desmetilación.

USOS AUTORIZADOS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD

CULTIVO	PLAGA/EFECTO	DOSIS	P.S. (días)
Avena, cebada, centeno, trigo, triticale	Helmintosporiosis, septoria	1 l/ha	28
Espárrago	Roya	1 l/ha	NP
Melocotonero, nectarino	Monilia, oidio	50 – 75 cc/hl 0,6 – 1,1 l/ha	7

En avena, cebada, centeno, trigo y triticale: Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 30 (comienzo del encañado) a BBCH 60 (fin de la floración). Emplear un volumen de caldo de 200-400l/ha.

En espárrago: Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña mediante pulverización normal con tractor o manual (lanza y/o mochila) en postcosecha. Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha.

En melocotonero y nectarino: Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 57 (sépalos abiertos; ápices de los pétalos visibles; flores simples con pétalos blancos o rosados) a BBCH 89 (madurez de consumo). Emplear un volumen de caldo de 1.200 – 1.500 l/ha. Dosis por aplicación: 0,6 – 1,1 l/ha.

PRECAUCIONES DE USO

Se recomienda alternar los tratamientos con otros fungicidas de distinta naturaleza, con el fin de evitar la aparición de resistencia. El preparado no se usará en combinación con otros productos.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

NÚMERO DE REGISTRO

25.94

