

1 kg



COMPOSITION

Métalaxyl 25% p/p (250 g/kg).
Poudre mouillable (WP).

APPLICATIONS AUTORISÉES

Traitements fongicides, préventifs et curatifs en cultures de :

Brocoli, chou-fleur, pomme de terre, chou pommé, vigne et carotte : contre mildiou.

Oranger, pamplemoussier et fraisières : contre la phytophthora.

Tabac : contre la moisissure bleue.

DOSE

Appliquer en pulvérisation normale à 0,08-0,12% (80-120 g/100 l).

Agrumes et fraisières : appliquer à travers des systèmes d'arrosage par goutte-à-goutte à une dose de 1,5 kg/ha.

Fraisières : appliquer au printemps et en automne à travers un système d'arrosage par goutte-à-goutte, en réalisant 3 applications à des intervalles de 14-21 jours.

Oranger, pamplemoussier : appliquer au printemps et en automne à travers un système d'arrosage par goutte-à-goutte, en réalisant 3 applications à des intervalles de 14-21 jours, peut aussi être appliqué préalablement à un arrosage dans la zone de goutte-à-goutte à des doses de 4-8 g/m².

DÉLAI DE SÉCURITÉ

Brocoli, chou-fleur, chou pommé, carotte, oranger, pamplemoussier, pomme de terre, tabac et vigne : 21 jours. **Vigne de vinification** : 28 jours. **Fraisières** : 14 jours.

CLASSEMENT DES DANGERS



NUMERO D'ENREGISTREMENT

25.330

