



### COMPOSICIÓN

Hexitiazox: 25,13 % p/v (24,59 % p/p).  
Suspensión concentrada (SC).

### USOS

Acaricida no sistémico con acción por contacto e ingestión, buena actividad translaminar y prolongado efecto residual. Posee actividad ovicida, larvicida y ninficida sobre numerosas especies de ácaros.

### USOS AUTORIZADOS

- **CÍTRICOS:** ácaros tetraniíquidos (*Tetranychidae*).
- **CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE:** Araña roja común (*Tetranychus spp.*)
- **FRUTALES DE PEPITA:** Araña roja común (*Tetranychus spp.*)
- **VID DE MESA Y VID DE VINIFICACIÓN:** Araña roja común (*Tetranychus spp.*).

### USOS MENORES AUTORIZADOS (por procedimiento nacional)

- **ALBARICOQUERO, CAQUI, CEREZO, CIRUELO, ENDRINO y FRUTALES DE CÁSCARA:** Araña roja común (*Tetranychus spp.*).

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Tratamiento insecticida/acaricida al aire libre por pulverización foliar mecánica y manual.

Aplicar mediante pulverización foliar normal al inicio de la infestación, recubriendo bien toda la vegetación, en especial el envés de las hojas. Tratar huevos y larvas antes de que alcancen el estado adulto. Para controlar ácaros en todas sus fases se utilizará mezclado con un acaricida adulticida.

En **ALBARICOQUERO, CEREZO, CIRUELO, ENDRINO Y FRUTALES DE CÁSCARA** (usos menores) aplicar de 160 a 300 mL de producto por hectárea con un volumen de caldo de 800 a 1.000 L/ha. Realizar un único tratamiento durante BBCH00-69.

En **CAQUI** (uso menor) aplicar de 160 a 200 mL de producto por hectárea con un volumen de caldo de 800 a 1.000 L/ha. Realizar un único tratamiento antes de la formación del fruto, hasta el fin de la floración BBCH00-69.

En **CÍTRICOS** aplicar de 40 a 150 mL de producto por hectárea con un volumen de caldo de 1.000 a 2.500 L/ha. Realizar un único tratamiento durante BBCH00-97.

En **CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE** aplicar de 60 a 150 mL de producto por hectárea con un volumen de caldo de 300 a 500 L/ha. Realizar un único tratamiento durante BBCH10-89.

En **FRUTALES DE PEPITA** aplicar de 160 a 300 mL de producto por hectárea con un volumen de caldo de 800 a 1.000 L/ha. Realizar un único tratamiento durante BBCH00-97.

En **VID DE MESA Y VID DE VINIFICACIÓN** aplicar de 100 a 300 mL de producto por hectárea con un volumen de caldo de 500 a 1.000 L/ha. Realizar un único tratamiento durante BBCH00-97.

### PLAZO DE SEGURIDAD

- **Cucurbitáceas de piel no comestible:** 3 días.
- **Cítricos:** 14 días.
- **Vid de mesa y vid de vinificación:** 21 días.
- **Caqui y frutales de pepita:** 28 días.
- **Albaricoquero, cerezo, ciruelo, endrino y frutales de cáscara:** No procede fijar plazo de seguridad.

### PRECAUCIONES

No mezclar con insecticidas piretroides.

### CLASIFICACIÓN DE PELIGROS



### NÚMERO DE REGISTRO

ES-01114