

# CARGOLUQ 5 PLUS



## COMPOSICIÓN

Metaldehído 5% p/p (50 g/kg) (adicionado de colorante).  
Cebo en gránulos (GB).

## USOS

CARGOLUQ 5 PLUS es un cebo molusquicida en forma de gránulos, a base de metaldehído, para el control de babosas y caracoles, que actúa por contacto e ingestión. El animal deja de alimentarse enseguida, comienza a segregarse gran cantidad de moco, se deseca y muere.

## APLICACIONES, DOSIS AUTORIZADAS Y MODO DE EMPLEO

Tratamiento, molusquicida por aplicación mecánica (al aire libre) y manual (al aire libre e invernadero). Esparcir el producto sobre el suelo en pequeños montones o cordones entre las líneas de siembra en los puntos a proteger. Aplicar tras efectuar trasplantes o siembras, así como tan pronto se observen daños en las plantas. Es conveniente que el suelo esté húmedo para mayor actividad sobre estos parásitos. En caso de ataque fuerte o prolongado, puede ser necesario repetir el tratamiento a los 7-10 días, realizando un máximo de 2 aplicaciones.

USO	AGENTE	DOSIS	Nº APLICACIONES	INTERVALOS	CONDIC. ESPECÍFICO
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, ornamentales herbáceas, palmáceas	Babosas, limacos Caracoles	5 - 7 kg/ha	Máx.2	7-10 días	Uso al aire libre y en invernadero.
Avena, cebada, centeno, trigo y triticale.	Babosas, limacos Caracoles	7 kg/ha	Máx.2	7 días	Uso al aire libre. Aplicar el producto desde siembra hasta BBCH 29.
Berenjena, tomate	Babosas, limacos Caracoles	7 kg/ha	Máx.2	7 días	Uso en invernadero. Aplicar desde BBCH 00 hasta BBCH 41.
Brotos tiernos, incluidas las especies de Brassica), mostaza, mostaza blanca	Babosas, limacos Caracoles	7 kg/ha	Máx.2	7 días	Aplicar el producto al aire libre desde BBCH 00 hasta BBCH 19.
Lechuga y similares y rúcula.	Babosas, limacos Caracoles	7 kg/ha	Máx.2	7 días	Aplicar el producto al aire libre desde BBCH 00 hasta BBCH 19. Aplicar el product en invernadero desde BBCH 00 hasta BBCH 41
Céspedes	Babosas, limacos Caracoles	7 kg/ha	Máx.2	7 días	Uso al aire libre. Aplicar el producto desde siembra hasta BBCH 99.
Cítricos, frutales de cascara, frutales de hueso, frutales de pepita.	Babosas, limacos Caracoles	7 kg/ha	Máx.2	7 días	Uso al aire libre. Aplicar el producto desde BBCH 00 hasta BBCH 69.
Colinabo, nabo, remolacha azucarera, remolacha de mesa, remolacha forrajera.	Babosas, limacos Caracoles	7 kg/ha	Máx.2	7 días	Uso al aire libre. Aplicar el producto desde siembra hasta BBCH 15.
Fresal	Babosas, limacos Caracoles	7 kg/ha	Máx.2	7 días	Aplicar el producto desde siembra hasta BBCH 69.
Tabaco	Babosas, Caracoles	5-7 kg/ha	Máx.2	7 días	Uso al aire libre. Aplicar el producto desde siembra o trasplante hasta 9 o más brotes laterales visibles (BBCH 29).

## PLAZO DE SEGURIDAD

No procede fijar plazo de seguridad.

## PRECAUCIONES DE USO

El preparado no se utilizará en combinación con otros productos. Este producto es peligroso para perros y otros animales domésticos. Evitar que el producto caiga sobre las plantas cultivadas. No aplicar directamente el producto en las partes recolectadas de las plantas. Para el uso en cultivos frutales adoptar prácticas que permitan evitar el contacto de los frutos con el producto y el suelo. No recolectar los frutos en contacto con el suelo.

## CLASIFICACIÓN DE PELIGROS



100 LUQSA

## NÚMERO DE REGISTRO

22.870