

CONTROLLER



COMPOSICIÓN

Fluroxipir (como 1-metil heptil ester), 20% p/v (200 g/L).
Emulsión de aceite en agua (EW).

USOS

CONTROLLER es un herbicida selectivo, se absorbe por las hojas y se trasloca a otras partes de la planta.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD

Tratamientos herbicidas selectivos en cultivos extensivos para el control de malas hierbas anuales y perennes de hoja ancha.

Aplicación mediante pulverización al suelo en post-emergencia en un único tratamiento y con un volumen de caldo de 200-400 L/ha

La eficacia puede reducirse con temperaturas frías (menos de 10°C) o condiciones secas.

En el cultivo de cebolla pueden apreciarse amarillos, necrosis o enrollamiento en las hojas. Estos síntomas suelen aparecer especialmente si concurren diferencias significativas de temperatura poco después de la aplicación en cebolla en el estado de crecimiento de "4 hojas". Estos síntomas suelen ser generalmente transitorios y no afectan ni al rendimiento ni a la calidad.

CULTIVO	MALAS HIERBAS	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN	PLAZO DE SEGURIDAD
Cebolla	Anuales y perennes de hoja ancha	1 L/ha	Aplicar durante BBCH 12-14.	NP
Cereales de invierno y primavera	Anuales y perennes de hoja ancha	1 L/ha	BBCH 12-39	NP
Céspedes	Anuales y perennes de hoja ancha	1 L/ha	BBCH 20-25	NP
Cítricos	Anuales y perennes de hoja ancha	1,5 L/ha	Primavera-otoño	15 días
Frutales de pepita	Anuales y perennes de hoja ancha	1,5 L/ha	Primavera-otoño	15 días
Maíz	Anuales y perennes de hoja ancha	1 L/ha	BBCH 12-16	NP
Olivo	Anuales y perennes de hoja ancha	1,5 L/ha	Primavera-otoño (después de la cosecha)	120 días

*NP= No Procede.

- **CEBOLLA:** aplicar durante BBCH 12-14 a la dosis de 1L/ha en una sola aplicación.
- **CEREALES DE INVIERNO Y PRIMAVERA:** exclusivamente para siembras de invierno. Aplicar en BBCH 12-39 a la dosis de 1 L/ha en una sola aplicación.
- **CÉSPEDES:** exclusivamente en céspedes recreativos. Aplicar en BBCH 20-25 a la dosis de 1 L/ha en una sola aplicación.
- **CÍTRICOS Y FRUTALES DE PEPITA:** aplicación en bandas. Aplicar en primavera-otoño a la dosis de 1,5 L/ha en una sola aplicación.
- **MAÍZ:** aplicar en BBCH 12-16 a la dosis de 1 L/ha en una sola aplicación.
- **OLIVO:** aplicación en bandas. Aplicar en primavera-otoño después de la cosecha a la dosis de 1,5 L/ha en una sola aplicación.
Las aceitunas no deben recogerse del suelo.

USOS MENORES AUTORIZADOS

CULTIVO	MALAS HIERBAS	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN	PLAZO DE SEGURIDAD
Ajo, Puerro	Anuales y perennes de hoja ancha	1L/ha	Aplicar durante BBCH 12-14.	NP
Aguacate y Caqui	Anuales y perennes de hoja ancha	1,5 L/ha	Primavera-otoño	15 días
Albaricoquero, Cerezo, Ciruelo y Endrino	Anuales y perennes de hoja ancha	1,5 L/ha	Hasta BBCH 10-69	NP
Almendro, Avellano, Castaño, Nogal, Pacano, Nuez de Pecán y Pistachero	Anuales y perennes de hoja ancha	1,5 L/ha	Hasta BBCH 10-69	NP

*CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

- **AJO, PUERRO:** aplicar durante BBCH 12-14 a la dosis de 1L/ha en una sola aplicación.
- **AGUACATE y CAQUI:** aplicar en pulverización al suelo en bandas, en una única aplicación en primavera-otoño.
- **ALBARICOQUERO, CEREZO, CIRUELO y ENDRINO:** aplicar en pulverización al suelo en bandas, en una única aplicación antes de la formación del fruto, hasta el fin de la floración (BBCH: 10-69).
- **ALMENDRO, AVELLANO, CASTAÑO, NOGAL, PACANO, NUEZ DE PECÁN y PISTACHERO:** aplicar en pulverización al suelo en bandas, en una única aplicación antes de la formación del fruto, hasta el fin de la floración (BBCH: 10-69).

PRECAUCIONES

Aplicar en malas hierbas de crecimiento activo (en estados de desarrollo tempranos de las malas hierbas). No pulverizar en condiciones de viento para prevenir la deriva del producto a los cultivos y plantas no objetivo colindantes y a las masas de aguas superficiales.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS



NÚMERO DE REGISTRO

ES-01188

