

PRIMERO®**COMPOSICIÓN**

Nicosulfuron 4% p/v.
Dispersión en aceite (OD).

APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS DE APLICACIÓN

USO	AGENTE	DOSIS	Nº APLICACIONES	INTERVALOS	VOL. CALDO	CONDIC. ESPECÍFICO
Maíz	Cañota, <i>Sorghum halepense</i>	(ver. condic.)	2	10	200 - 400 L/ha	Dos aplicaciones separadas 10 días, a dosis 1 + 0,5 L/ha. También en maíz forrajero
	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	1 L/ha	1	-		También en maíz forrajero

Herbicida sistémico selectivo. Controla malas hierbas en postemergencia precoz. Aplicar en pulverización con tractor desde el estadio de 3 o 4 hojas, desplegadas (BBCH 13) procurando no sobrepasar el estadio de 8 o 9 o más hojas, desplegadas (BBCH 19).

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede fijar plazo de seguridad.

PRECAUCIONES

No sembrar colza como cultivo siguiente en la rotación.

Si se han utilizado insecticidas de suelo órgano-fosforados en el momento de la siembra, la aplicación de PRIMERO® puede originar alguna clorosis en las hojas de maíz.

No aplicar ningún insecticida organofosforado por vía foliar 7 días antes o después del tratamiento con PRIMERO®.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS**NÚMERO DE REGISTRO**

24.658

