



COMPOSICIÓN

Piriproxifen: 10% p/v (100 g/L).
Concentrado emulsionable (EC).

Contiene nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-47-8) y 2- Etilhexil-S-Lactato (CAS 186817-80-1).

USOS AUTORIZADOS

- **CÍTRICOS:** Caparreta, Piojo blanco, Piojo gris, Piojo rojo California y Serpeta.
- **FRUTALES DE HUESO:** Piojo de San José.
- **FRUTALES DE PEPITA:** Piojo de San José.
- **TOMATE:** Mosca blanca.

USOS MENORES AUTORIZADOS

- **ALGODONERO:** Mosca blanca.
- **ALMENDRO:** Cochinillas y Piojo de San José.
- **AVELLANO, CASTAÑO, NOGAL, PACANO, NUEZ DE PECÁN y PISTACHERO:** Cochinillas.
- **BERENJENA:** Mosca blanca.
- **CAQUI:** Cochinillas.

Aplicar en pulverización foliar normal en los primeros estadios larvarios de los insectos a controlar, preferiblemente de la primera generación.

- **ALGODONERO** (uso menor): efectuar un solo tratamiento por campaña a la dosis de 0,5 a 0,75 L/ha con un volumen de caldo de 1.000 L/ha, antes de la apertura de las capsulas.
- **ALMENDRO, AVELLANO, CASTAÑO, NOGAL, PACANO, NUEZ DE PECÁN y PISTACHERO** (usos menores): efectuar un solo tratamiento en prefloración a la dosis de 40-50 mL por 100 litros de agua (0,04-0,05%), con un volumen de caldo de 700-1.000 L/ha, sin sobrepasar los 0,5 litros de producto/ha.
- **BERENJENA** (uso menor): solo en cultivo de invernadero. Efectuar hasta 2 aplicaciones por campaña a la dosis de 50-75 mL por 100 litros de agua (0,05-0,075%), con un volumen de caldo de 1.000-1.500 L/ha, sin sobrepasar los 0,8 L/ha por aplicación.
- **CAQUI** (uso menor): efectuar un solo tratamiento en prefloración a la dosis de 40-50 mL por 100 litros de agua (0,04-0,05%), con un volumen de caldo de 700-1.000 L/ha, sin sobrepasar los 0,5 litros de producto/ha.
- **CÍTRICOS:** efectuar un solo tratamiento por campaña a la dosis de 50-75 mL por 100 litros de agua (0,05-0,075%), con un volumen de caldo de 1.000-1.500 L/ha sin sobrepasar los 1,125 litros de producto por hectárea.
- **FRUTALES DE HUESO Y PEPITA:** efectuar un solo tratamiento en prefloración a la dosis de 40-50 mL por 100 litros de agua (0,04-0,05%), con un volumen de caldo de 700-1.000 L/ha sin sobrepasar los 0,5 litros de producto por hectárea.
- **TOMATE:** aplicar sólo en invernadero a la dosis de 50-75 mL por 100 litros de agua (0,05-0,075%). Efectuar hasta 2 aplicaciones por campaña, con un volumen de caldo de 1.000-1.500 L/ha sin sobrepasar los 0,8 litros por hectárea de formulado por aplicación.

PLAZO DE SEGURIDAD

Berenjena y tomate: 3 días.

Cítricos: 30 días.

Resto de cultivos: No procede fijar plazo de seguridad.

PRECAUCIONES

Para evitar la aparición de resistencias, no efectuar con este producto ni con ningún otro que contenga Piriproxifen más de una aplicación por campaña en Piojo y Cochinillas y dos en Mosca blanca.

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS



NÚMERO DE REGISTRO

24.635